

## Yêu cầu kỹ thuật khi nuôi chim Cút đẻ



Những năm gần đây nghề chăn nuôi chim cút đã phát triển ở nhiều vùng trong tỉnh; tập trung ở ven thành phố, thị trấn và đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ nông dân. Trong đó nuôi cút đẻ lấy trứng cung cấp cho thị trường tiêu dùng có lợi thế hơn so với nuôi cút lấy thịt. Chúng tôi xin hướng dẫn một số yêu cầu kỹ thuật trong nuôi chim cút đẻ để bà con nông dân hiểu thêm và áp dụng vào sản xuất

### 1. Một số đặc điểm sinh học của chim cút:

- Chim cút có thị giác rất phát triển nên có khả năng nhận biết và chọn lọc thức ăn cao, nhưng vị giác và khứu giác lại kém phát triển nên khó nhận biết mùi vị thức ăn. Vì vậy, cút rất dễ bị ngộ độc thức ăn do ăn phải thức ăn ôi, mốc.
- Chim cút mặc dầu đã được thuần hóa nuôi dưỡng từ lâu nhưng còn mang nhiều đặc tính hoang dã. Đáng chú ý là vẫn sợ tiếng động, tiếng ồn, thường bay lên và vào thành lồng, chết.
- Ngày nay, chim cút nuôi nhốt, cho ăn đầy đủ, chăm sóc tốt cho sản lượng trứng 300-360 trứng/năm, có con đến 400 trứng/năm. Tỷ lệ đẻ trung bình đến 80-90%, khối lượng trứng trung bình 10-15 g/quả. Tuổi bắt đầu đẻ trứng khoảng 40 ngày, thời gian sử dụng đẻ trứng 14- 18 tháng.
- Nuôi cút đẻ không đòi hỏi nhiều diện tích chuồng nuôi, thức ăn chi phí không nhiều nhưng hiệu quả chăn nuôi cao. Mỗi ngày cho ăn 20-25gr thức ăn và cút cho một quả trứng nặng 10-11 gam cho thấy cút là loài gia cầm có năng suất tạo trứng cao.

### 2. Giống chim cút:

Ở nước ta, đã nhập các giống cút từ Anh, Pháp, Nhật và có màu vỏ trứng đặc trưng để nhận biết. Nhưng hiện nay ở các đàn cút đẻ thường nhận được trứng có nhiều màu pha trộn, đốm đen to, nhỏ không như nhau chứng tỏ cút đã bị pha tạp ở các mức độ khác nhau.

### 3. Kỹ thuật nuôi cút đẻ:

#### - Chuồng nuôi:

- + Qui cách lồng 1,0 x 0,5 x 0,2m, nuôi được 20-25 cút mái.
- + Nóc lồng làm bằng vật liệu mềm, vì cút hay nhảy dựng đứng có thể bể đầu.
- + Đáy lồng dốc 2-3% để trứng lăn ra, làm bằng lưới ô vuông 1-1,5cm, để cút đi đứng thoải mái và phân lọt xuống vỉ hứng phân.
- + Vách chuồng có các song dọc cách nhau 2,8 cm đủ kê hở cho cút lấy thức ăn, nước uống từ bên ngoài thành chuồng.

+ Khi nuôi nhiều thì chồng các lồng lên nhau, cách nhau 10-12cm để đặt vỉ hứng phân.

+ Máng ăn, máng uống: Có thể làm bằng nhôm hay nhựa treo xung quanh chuồng, quy cách dài 0,5 hoặc 1,0m, rộng 6 - 7cm. cao 5 - 7cm.

### **- Chọn giống:**

Chọn mua cút ở những cơ sở sản xuất giống bố mẹ. Cút giống phải khỏe mạnh, không dịch bệnh, dị tật, nhanh nhẹn, háu ăn...

Cút con lúc ngày 20 ngày tuổi có thể phân biệt trống mái. Nuôi đến 25 ngày tuổi thì chọn lọc những con đủ tiêu chuẩn làm giống nuôi riêng:

+ Chọn cút mái: Lông ức màu vàng rom, lông đốm chấm đen. Đầu thanh tú, cổ nhỏ, lông da bóng mượt, xương chậu rộng, hậu môn nở, đỏ hồng và mềm mại. Khối lượng 70-75g/con lúc 20 ngày tuổi.

+ Chọn cút trống: Lông ức và hai bên má màu nâu đỏ (verni) không xen màu khác. Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lông da bóng mượt, thân hình gọn, đầu nhỏ, mỏ ngắn, cổ dài, ngực nở, 25 ngày tuổi nặng 70-90gr.

### **- Chăm sóc, nuôi dưỡng cút đẻ:**

+ Cút mái bắt đầu đẻ quả trứng đầu tiên lúc 42-45 ngày tuổi. Tỷ lệ đẻ tăng dần và đạt cao nhất tới 90-95%. Để tập trung vào buổi chiều 13-18 giờ (khoảng 75% tổng số trứng đẻ/ngày). Thời gian đẻ kéo dài tới 60 tuần thì giảm đẻ.

+ Mỗi ngày cút ăn 20-25gr, thức ăn hỗn hợp và đẻ 1 quả trứng nặng 10-11gr (bằng 10% cơ thể), cho nên thức ăn của cút phải bảo đảm yêu cầu dinh dưỡng cao, nhất là đạm, khoáng và vitamin...

Đạm 24-26%, năng lượng trao đổi 2800-3000 kcal/kg thức ăn, calcium 4%, các loại vitamin và nguyên tố vi lượng khác cao hơn thức ăn của gà 4 lần.

+ Thức ăn phải bảo đảm độ mịn, độ đồng đều cao, hợp vệ sinh, không ẩm, mốc. Nên cho ăn nhiều lần trong ngày. Thay đổi thức ăn cho cút phải từ từ, tránh đột ngột.... Tốt nhất là nên sử dụng thức ăn hỗn hợp chế biến sẵn dùng cho cút đẻ của các nhà máy sản xuất.

+ Nước uống: Mỗi ngày cút uống 50-100ml nước, nhưng phải cung cấp đầy đủ nước sạch và mát, cho cút uống tự do

+ Nhiệt độ thích hợp cho cút đẻ 20-25 °C, mùa hè có nhiệt độ 35-37 °C cút đẻ giảm đi nhiều. Vì vậy cần phải chống nóng cho cút trong mùa hè và giữ ấm vào mùa đông.

+ Ánh sáng: cần 16 giờ chiếu sáng/ngày. Dùng bóng đèn 40-60 W/3m<sup>2</sup>.

### **- Vệ sinh chăn nuôi:**

+ Một số bệnh thường gặp ở chim cút: Dịch tả, Marek, thương hàn, cầu trùng...

+ Phòng bệnh cho cút đẻ bằng vaccin: Cút 20 ngày tuổi dùng vaccin ND-Lasota hòa vào nước uống. Cách 3 tháng sau hòa cho uống lại.

+ Định kỳ vệ sinh và sát trùng chuồng trại

+ Không mua cút không rõ nguồn gốc hoặc từ những ổ dịch.